

## **Verhaltensempfehlung nach Implantation**

- · Nach einer Zahnarztspritze dürfen Sie aus rechtlichen Gründen kein Fahrzeug im Straßenverkehr führen
- Im Mund befindliche Tupfer nach ca. 1 Stunde entfernen
- Körperliche Ruhe, keine Überanstrengung, Kopf hoch lagern
- Den Kiefer möglichst 1 Woche nicht mit Prothesen und Zahnersatz belasten
- Nur mit feuchtkalten Waschlappen kühlen, kein Eis verwenden
- 1 Woche keine Munddusche benutzen
- · Normal Zähne putzen, jedoch unter Schonung des Wundbereichs
- Antibiotika bis zum 3. postoperativen Tag weiter einnehmen
- Als Schmerzmittel empfehlen wir Ibuprofen 400 Tabletten (frei verkäuflich), diese können bis zu 4 x täglich eingenommen werden
- Flüssige oder weiche und nicht zu heiße Kost
- Für 3 Tage kein Alkohol, kein Kaffee / Rauchen stört die Wundheilung
- Eine Schwellung und eingeschränkte Mundöffnung sind normal
- Bei Nachblutung im Mund einen Gazetupfer oder ein sauberes, frisch gebügeltes Stofftaschentuch auflegen und für 30-45 Minuten aufbeißen

## **Gute Besserung!**

Rufen Sie bei Rückfragen gerne an.

( +49 (0) 511 978 117 0